

Aussaat & Pflanzung im April



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Nutzgarten](#)



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Ziergarten](#)



Gemüse erfolgreich vorkeimen

[Das 1x1 der richtigen Aussaat](#)

[Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat](#)

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

[Weiterlesen...](#)

Nutzgarten

Aussaaten von Gemüse und Kräutern im April

Welche Sorten von Kräuter oder Gemüse Sie in diesem Monat schon alles vorziehen oder direkt aussäen können.

-

Vorzucht (Erläuterungen)

-

Vorzucht

Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.

-

Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

-

Freilandaussaat (Erläuterungen)

-

Freilandaussaat

Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

-

Amaranth

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende März

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Mai

-

Abstand: 40 x 10 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Ernte: Blätter - Mai bis Juli / Samen - September bis Oktober

-

Artischocken

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März

-

Freilandaussaat: ab Mitte / Ende April

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 20 Tage / bei 20 - 25 °C

-

Ernte: ab Ende August 1. Jahr, sonst Juni/Juli

-

Aubergine

-

Vorzucht: ab Anfang Januar - bis Ende März

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 cm

-

Keimung: 14 - 25 Tage / bei 22 - 25 °C

-

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende September

-

Baldrian

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang April

-

Freilandaussaat: Mitte März bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 19 - 21 °C

-

Ernte: Blüten - Juli bis August / Wurzeln ab Oktober

-

[Basilikum](#)

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juli

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 25 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 13 - 14 Tage / bei 15 - 18 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

•

Beifuß

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Mitte Mai

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Mitte Mai

◦

Abstand: 50 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 14 - 24 °C

◦

Ernte: Kraut und Blütenrispen vor der Blüte / Wurzeln im Herbst

•

Blumenkohl

◦

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März (unter Glas/Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Mitte Juni

-

Abstand: 50 x 40-50 cm, Herbstsorten 60 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 14 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Bohnenkraut

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

-

Abstand: 20 x 25 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Brokkoli

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juni (Frühbeet)

◦

Freilandaussaat: ab Ende April - bis Ende Juni

◦

Abstand: 40 x 50 cm bis 50 x 50 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 8 - 12 Tage / bei 15 - 16 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

•

Bunching Zwiebel

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 35 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

◦

Ernte: ganzjährig

•

Eisbergsalat

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Erbse (Markerbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Erbse (Schalerbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Erbse (Zuckererbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Feldsalat (Vorkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Mitte April

◦

Abstand: 20 x 15 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis er blüht und ggf. länger

•

Gurken / Freilandgurken

Daten sehr stark sortenabhängig

◦

Vorzucht: ab Ende März - bis Mitte Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 80 - 100 x 30 - 40 cm

◦

Aussaattiefe: 3 cm

◦

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 16 - 20 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Honigmelone

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 100 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Karotte

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 5 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Kartoffel

-

Vorkeimen: hell, ab Anfang März - bis Ende März

-

Vorkeimtemperatur: 12 bis 14 °C

-

Freilandaussaat: nach Sorte ab Mitte April bis Ende Mai

-

Abstand: 30 - 40 x 60 - 70 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 5 cm (später anhäufeln)

-

Ernte: ab Mitte Juli (Frühkartoffeln) - bis Mitte Oktober

-

Knollensellerie

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April

-

Abstand: 20 x 40 cm oder 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken

-

Keimung: 18 - 26 Tage / bei 19 - 22 °C

-

Ernte: ab Anfang September

-

Kohlrabi

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang Mai (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 25 cm bis 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Kopfsalat

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Kürbis

-

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 100 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2,5 cm

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Lauchzwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

◦

Ernte: ganzjährig

•

Mais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 5 cm

◦

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

◦

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

•

Mangold

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 25 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Melone

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 100 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Möhre

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

◦

Abstand: 25 x 5 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Paprika

◦

Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April

◦

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

◦

Abstand: 60 x 60 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 cm

◦

Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C

◦

Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober

•

Pastinake

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

-

Abstand: 30 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 18 - 20 Tage / bei 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Peperoni

-

Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 40 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 cm

-

Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C

-

Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober

-

Petersilie

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

-

Pflücksalat

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Porree

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

-

Abstand: 15 x 30 cm bis 20 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keim-Vorbehandlung 7 Tage bei 5 - 10 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende Januar

-

Puffbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Februar - bis Ende April

-

Abstand: 40 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 3 - 4 cm

-

Keimung: 5 - 10 Tage / bei 10 - 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

Radieschen (unter Glas)

-

Direktaussaat: ab Januar - bis April und August - bis Oktober

-

Abstand: 15 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 - 19 °C

-

Ernte: ab Februar - bis Mai und ab September - bis November

-

Radieschen (Freiland)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September

-

Abstand: 15 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Rettich

-

Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Rosenkohl

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 60 cm (im Mai vereinzeln)

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Rote Bete

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

-

Abstand: 30 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang August - bis Ende November

-

Rotkohl

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Anfang April
(im Topf oder im Beet unter Folie)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 50 cm oder 40 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende November

-

Salat (Eisbergsalat)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Feldsalat Vorkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Mitte April

-

Abstand: 20 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis er blüht und ggf. länger

-

Salat (Kopfsalat)

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Pflücksalat)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Sellerie (Stangensellerie)

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende April unter Glas

-

Abstand: 40 x 40 cm oder 35 x 40 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 20 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Sonnenblume

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 2 cm

◦

Keimung: 7 - 14 Tage / bei 15 - 18°C

◦

Blüte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Spinat (Frühlings-Aussaatz)

◦

Vorzucht: ab Februar - bis April unter Glas

◦

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende April

◦

Abstand: 20 x 7 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keim-Vorbehandlung günstig 7 Tage bei 5 - 10°C (Kaltkeimer)

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Mitte Juli

•

Tomate

◦

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: je nach Sortengröße 50 x 80 cm bis 90 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 23 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Wassermelone

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 100 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Weißkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Mitte Juni

-

Abstand: 40 x 40 cm, Herbstsorten 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Wirsingkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Zuckermais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

-

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 5 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

-

Zwiebel (Frühjahrs-Aussaat)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

-

Zu kleine Zwiebeln als Steckzwiebelnd stecken

-

Abstand: 25 x 8-10 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 25 Tage / bei 12 - 18 °C

◦

Ernte: ab Ende August - bis Ende Oktober

•

Zwiebel (Bunching Zwiebel)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 35 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

◦

Ernte: ganzjährig

•

Zwiebel / Gemüsezwiebel

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

◦

Abstand: 30 x 10 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Zwiebel (Lauchzwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

Weitere Infos zu Gemüse-Aussaaten im April

-

Wichtig bei Aussaaten im April

Es gibt bei vielen Gemüsearten Sorten, die für eine Frühlingsaussaat besser und schlechter geeignet sind. Lesen Sie dazu die Packungen im Handel, bevor sie kaufen. Verwenden sie eher Sorten von z.B. Rettich, Radieschen, Salat, Kohlrabi oder gelben Rüben, die sich besser für den Frühlingsanbau eignen als andere.

-

Aussaat ab März direkt ins Freiland

Meerrettich, Schnittlauch, Schalotten, Salat, Kohlrabi, Radieschen, gelbe Rüben, Rettich, Steckzwiebeln, Speiserüben und Sommerblumen wie Cosmea.

-

Aussaat im April direkt ins Beet

Sonnenblumen, Mohrrüben (frühe oder späte Sorten), Wirsingkohl, Wurzelpetersilien, Schwarzwurzeln, Herbstporree (Herbstlauch), Petersilie, Koriander, Bohnenkraut, Rettich, Weißkohl, Kerbel, Dill, Maggikraut, Beifuß, Gartenkresse, Spinat, Kopfsalat, Mangold, Lattich (Römischer Salat), Pflücksalat, Erbsen (eventuell mit einem Vlies abdecken als Schutz vor Vögeln), Radieschen (Säen Sie jede Woche einige wenige aus, dann haben Sie jederzeit frische Radieschen), Schalotten, Steckzwiebeln

Ggf. sollte man einige Sorten von Aussaaten wie Spinat, Mangold, Lattich (Römischer Salat), Kopfsalat, Pflücksalat, vor Frost schützen (Vlies oder Folien).

-

Aussaat ab Ende April direkt ins Freiland:

Brokkoli, einige Sorten von Blumenkohl und Rosenkohl, Artischocken (letztere tragen erst im Jahr nach der Aussaat Früchte. Um dieses Gartenjahr Früchte zu erhalten müssen Artischocken schon im Februar vorgezogen werden.

-

Allgemeines über die Anzucht von Pflanzen aus Samen unter [Generative Vermehrung - Aussaat](#)

Pflanzung von Gemüse, Kräutern und Obst im Nutzgarten

-

Obst und Beerenobst

Beerenobst wie Heidelbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, oder Johannisbeeren tragen zwar besser, wenn sie zeitiger oder im Herbst gepflanzt wurden, aber möglich ist es auch jetzt noch.

Für alle Sorten und Typen von Obst, wie z.B. Pfirsichen, Weinreben und Aprikosen, Pflaumen, Äpfel und Birnen wird es allerhöchste Eisenbahn. Schnitt nicht vergessen, auch bei Containerpflanzen!

-

Erdbeeren

Auch Erdbeeren lassen sich jetzt noch sehr gut aus Ausläufern vermehren oder umsetzen.

Erdbeeren in Töpfen aus dem Geschäft lassen sich natürlich noch länger pflanzen. ...mehr dazu unter [Erdbeeren vermehren & pflanzen](#)

-

Kartoffeln

Ab Mitte April können Frühkartoffeln gelegt werden. Kartoffeln legen Sie aber am besten immer zu oder direkt nach Ostern. Wenn Sie Ihre Kartoffeln vorkeimen, können Sie rund zwei Wochen früher ernten. Wie das genau geht? [...mehr dazu hier](#)

Weitere Themen zum Kartoffelanbau:

[Kartoffeln anbauen](#) | [Kartoffeln vorkeimen](#) | [Kartoffeln Pflanzenschutz](#)

-

Spargel

Spargel kann als Setzlinge im April ins fertig präparierte Spargelbeet gepflanzt werden.

-

Kräuter und Zwiebeln

-

Schnittlauch können Sie jetzt durch Teilung vermehren.

-

vorgezogene Zwiebeln werden jetzt ins Beet umgesetzt.

-

Ziergarten

-

Dahlien

Dahlien und andere Knollenpflanzen, deren Knollen man im eigenen Keller überwintert hat, werden nun wieder ausgepflanzt. Für neue, gekaufte Knollen gilt das gleiche.

-

Sträucher und Bäume

Wurzelnackte Gehölze und Bäume, die bis jetzt noch keine Blätter getrieben hat, können Sie bedenkenlos pflanzen bzw. umpflanzen. Sind die ersten Blätter da, wird es mit jedem Tag enger.

-

Rhododendron

Sie können Ihre Rhododendron bis nach der Blüte problemlos verpflanzen – feucht halten!

-

Rosen

Der April ist die richtige Zeit um Rosen zu pflanzen.

-

Herbstblüher / Zwiebelnpflanzen

Jetzt im Frühling pflanzt man die Zwiebeln der Herbstblüher.

-

Stecken Sie die Zwiebeln richtig herum. Oft kann man es gar nicht so leicht erkennen, was

oben oder unten ist.

-

Achten Sie darauf die Zwiebeln etwa doppelt so tief in die Erde zu legen wie sie selber dick sind und decken Sie mit humoser Erde ab.

-

Stauden

Sie können im April die meisten Stauden oder Zwiebelpflanzen wie Hyazinthen sehr gut verpflanzen bzw. Stauden teilen. Das Teilen fördert das Wachstum und dient der Vermehrung. Das geht auch dann noch recht gut, wenn sie erste Triebe sprießen lassen. Das gilt auch für Rhabarber-Stauden.

-

Teilen Sie aber nur solche Stauden, die nicht im Frühjahr blühen.

-

Spätblühende Stauden bevorzugen aber eine möglichst zeitige Pflanzung im Frühjahr.

-

Wässern Sie die Stauden vor dem Pflanzen ordentlich, indem Sie die Wurzelballen für 10 bis 20 Minuten in ein Wasserbad tauchen. Die Stauden-Teile dann einzeln pflanzen. Pflanzen Sie so tief, wie sie zuvor auch gestanden haben – mit der Oberkante des Ballens zu ebener Erde abschließend. Die Stauden nicht „verbuddeln“!

-

Anders als Saaten vertragen die ja schon großen, wenn auch geteilten Stauden eine gute Düngergabe. Geben Sie ein bis zwei Handvoll Hornspäne, eine Schaufel gut zersetzten Kompost oder Mist in das Pflanzloch. Auch zwei bis drei handvoll abgestorbenes, trockenes Gras mit etwas Erde im Pflanzloch vermengt, tut eine gute Wirkung.

-

Gräser und Farne

Alle Gräser und Farne sollten möglichst zeitig im Frühjahr gepflanzt werden. So lange diese noch keinen Austrieb haben oder aus dem Topf kommen, geht das Umpflanzen zwar auch jetzt noch, aber die Entwicklung und Anwachsicherheit wird mit jedem Tag den Sie warten schlechter.

-

Grundlagen: [Grundlagen der Pflanzung](#) und [Vermehrung von Pflanzen](#)

