

Aussaat & Pflanzung im Juni



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Nutzgarten](#)



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Ziergarten](#)



Gemüse erfolgreich vorkeimen

[Das 1x1 der richtigen Aussaat](#)

[Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat](#)

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

[Weiterlesen...](#)

Nutzgarten

Aussaat von Gemüse und Kräutern im Juni

-

Gemüse & Kräuter

Im Juni gibt es noch eine ganze Menge an Gemüsesorten und Kräutern, die noch ausgesät werden können. So ist es z.B. noch nicht zu spät, folgende Gemüsesorten und Kräuter im Juni auszusäen

-

Bohnenkraut, Buschbohnen, Karotten (Sommersorten), Küchen-Kräuter, Mangold, Radieschen, Rettich, Römischer Salat, Salate, Speiserüben (bis August)

-

ab bzw. bis Mitte Juni direkt ins Freiland kann ausgesät werden:
Blumenkohl, Endivie, Radicchio, Zuckerhut

(eine vollständige Liste finden Sie unten folgend)

-

Aussaat für die Winterernte

-

Weißkohl und Rote Bete oder rote Rübe für die Wintereinlagerung werden am besten noch bis Mitte Juni ausgesät. Die Ernte ist dann besonders gut zum Einlagern im Winter geeignet.

Juni-Aussaat Gemüse und Kräuter

Was Sie im Juni noch alles zu welchen Bedingungen aussäen können:

Dabei geht es im Folgenden nur um reine Aussaaten. Das Pflanzen vorgezogener Pflanzen, wie z.B. Tomaten, ist natürlich noch möglich.

-

Vorzucht (Erläuterungen)

-

Vorzucht

Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.

-

Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

-

Freilandaussaat (Erläuterungen)

-

Freilandaussaat

Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.

■

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

■

Details zu Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

•

Basilikum

◦

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juli

◦

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

◦

Abstand: 25 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken

◦

Keimung: 13 - 14 Tage / bei 15 - 18 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

•

Blumenkohl

◦

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März (unter Glas/Frühbeet)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Mitte Juni

◦

Abstand: 50 x 40-50 cm, Herbstsorten 60 x 60 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 14 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

•

Bohnenkraut

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

◦

Abstand: 20 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 12 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Brokkoli

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juni (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Ende April - bis Ende Juni

-

Abstand: 40 x 50 cm bis 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 12 Tage / bei 15 - 16 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Bunching Zwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Buschbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 30 x 12 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Dill

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 11 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Eisbergsalat

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Endivien-Salat

-

Freilandaussaat: ab Mitte Juni - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Grünkohl

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

-

Abstand: 40 x 40 cm oder 50 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 bis 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 - 18 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Gurken / Freilandgurken

Daten sehr stark sortenabhängig

-

Vorzucht: ab Ende März - bis Mitte Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 - 100 x 30 - 40 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 16 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Karotte

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 5 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Kohlrabi

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang Mai (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 25 cm bis 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Kopfsalat

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Kürbis

-

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 100 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2,5 cm

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Lauchzwiebel

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 35 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

◦

Ernte: ganzjährig

•

Mais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 5 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

-

Mangold

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 25 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Möhre

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 5 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Petersilie

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

•

Pflücksalat

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Prunkbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3

-

Keimung: 5 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang August - bis Ende Oktober

-

Radieschen (Freiland)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September

-

Abstand: 15 x 15 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Rettich

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August

◦

Abstand: 25 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 1 cm

◦

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

•

Rote Bete

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

◦

Abstand: 30 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang August - bis Ende November

-

Salat (Eisbergsalat)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Kopfsalat)

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Salat (Pflücksalat)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

◦

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Schwarzwurzel

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 14 - 16 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende April

-

Stangenbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Weißkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Mitte Juni

◦

Abstand: 40 x 40 cm, Herbstsorten 50 x 50 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Zucchini

◦

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 100 x 100 cm

◦

Aussaattiefe: 2,5 cm

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Zuckermais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

-

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 5 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

-

Zwiebel (Bunching Zwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Zwiebel (Lauchzwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

Ziergarten

-

Gladiolen

Pflanzen Sie jetzt noch Gladiolen. Die spät, jetzt im Juni gesetzten Knollen blühen dann bis in den September hinein.

-

Iris oder Schwertlilie vermehren

Wenn die Iris oder Schwertlilie innen anfängt kahl zu werden liegt das in ihrer Natur, da sie

Rhizome bildet. Das sind umgewandelte (metamorphe) Sprossachsen, die nur flach unter der Erdoberfläche wachsen, und sich mit der Zeit ringförmig nach außen ausbreiten. Innen wird die Pflanze dann immer kahler.

Sie können die Pflanze jetzt im Juni nach der Blüte je nach Wunsch verjüngen oder vermehren und umpflanzen. Grabe sie dazu die Wurzelstöcke (Rhizome) aus und zerteilen Sie die äußeren Spitzen mit einem scharfen Messer in Stücke mit Blattschopf. Die Stücke sollten nicht kürzer als 10 Zentimeter sein und mindestens einen Blattschopf haben. Die Blätter kürzen Sie nun auf etwa die Hälfte ein und pflanzen die Stücke nun dort ein, wo Sie sie haben wollen. Pflanzen Sie die Stück nicht zu tief. Ein bis zwei Zentimeter Erde über den Rhizomstücken.

-

Rasen

Rasen kann ebenfalls noch im Juni ausgesät werden.

...mehr dazu unter [Rasen von A bis Z](#)

-

Grundlagen: [Grundlagen der Pflanzung](#) und [Vermehrung von Pflanzen](#)